

# 145. Dolina Przysowy i Słudwi (Przysowia and Sludwia River Valley)

Kryteria BirdLife International: **A1, A4iii, B1i, C1, C2, C3, C4, C6**

Autorzy: **Sławomir Chmielewski** (Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne), **Rafał Klimczak**



**Kod ostoi:** PL145

**Współrzędne geograficzne:** 52°16'N, 19°42'E

**Powierzchnia:** 3 284 ha

**Położenie administracyjne:** województwo mazowieckie; powiat gostyniński; województwo łódzkie; powiaty kutnowski i łowicki

**Natura 2000 (OSO):** proponowany obszar specjalnej ochrony ptaków

## Krótką charakterystyka ostoi

Niewielka ostoja obejmująca podmokłe łąki torfowe wzdłuż dolin rzek Przysowa i Słudwia. Jeden z najważniejszych w centralnej Polsce punktów koncentracji ptaków wodno-błotnych w czasie wiosennej migracji, których ugrupowania sięgają tu kilkudziesięciu tysięcy osobników. Ważne lęgowisko bączka oraz rybitwy czarnej.

## Short summary

A small site including alluvial meadows along Przysowa and Sludwia River Valleys. One of the most important congregation sites for waterbirds in Central Poland during spring migration: up to 50,000 of waterbirds migrate through this area. This is also important breeding site for Little Bittern and Black Tern.

## Ogólny opis ostoi

Ostoję obejmuje całą dolinę Przysowy oraz fragment doliny Słudwi od wsi Strzelce do miejscowości Retki. Pod względem fizjograficznym obszar ten leży w mezoregionie Równina Kutnowska. Jest to rejon wybitnie równinny z niewielkim spadkiem – praktycznie uniemożliwia to szybki spływ wody do rzek,


dzięki czemu tworzą się miejsca wypełnione wodą sąsiadujące bezpośrednio z suchymi obszarami; z tego powodu fauna i flora typowa dla miejsc suchych sąsiaduje z typową dla miejsc podmokłych. Teren ten to podmokłe łąki torfowe, odwadniane przez Przysowę i Słudwię, które w znacznym stopniu zatraciły swój pierwotny charakter na skutek użytkowania przez człowieka. łąki torfowe są

Tabela 3.145. Kluczowe gatunki ptaków stwierdzone w ostoi Dolina Przysowy i Słudwi

Table 3.145. Key bird species recorded in Przysowia and Sludwia River Valley IBA

Gatunek Species	Status Status	Rok Year	Liczebność Number	Oszacowanie liczebności Bird number assessment	Kryterium Criterion
<b>Ptaki wodno-błotne</b>	M	2006–2008	20000–50000 i		<b>A4iii, C4</b>
Łabędź czarnodzioby <i>Cygnus columbianus</i>	M	2007	1 i		
Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	M	2008	min. 12 i		
Gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>	M	2008	max. 5000 i		
<b>Gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i></b>	M	2008	max. 15300 i		<b>B1i, C3</b>
Gęgawa <i>Anser anser</i>	M	2008	max. 3000 i		
Gęgawa <i>Anser anser</i>	L	2007	2–20 p		
Bernikla białolica <i>Branta leucopsis</i>	M	2008–2009	5–10 i		
Świstun <i>Anas penelope</i>	M	2008	min. 300 i		
Rożeniec <i>Anas acuta</i>	M	2008	min. 120 i		
Cyranica <i>Anas querquedula</i>	M	2008	min. 100 i		
Płaskonos <i>Anas chryseata</i>	M	2008	min. 140 i		
Bąk <i>Botaurus stellaris</i>	L	2007	8–17 m		
<b>Bączek <i>Ixobrychus minutus</i></b>	L	2007	5–15 p		<b>C6</b>
Czapla biała <i>Egretta alba</i>	M	2007	min. 24 i		
Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>	L?	2007	0–1 p		
Bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	L	2007	18–24 p		
Kania ruda <i>Milvus milvus</i>	L	1999	1 p		
Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	M	2007	min. 5 i		
Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	L?	2007	0–1 p		
Błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>	L	2007	16–37 p		
Błotniak zbożowy <i>Circus cyaneus</i>	M/Z	2007	3–5 i		
Błotniak łąkowy <i>Circus pygargus</i>	M	2000	min. 20 i		
Błotniak łąkowy <i>Circus pygargus</i>	L	2007	6 p		

Gatunek Species	Status Status	Rok Year	Liczebność Number	Oszacowanie liczebności Bird number assessment	Kryterium Criterion
Sokół wędrowny <i>Falco peregrinus</i>	M	2000	2 i		
Kropiatka <i>Porzana porzana</i>	L	2004	13–15 m		
Zielonka <i>Porzana parva</i>	L	2000	6–8 m		
Derkacz <i>Grex crex</i>	L	2007	4–11 m		
Żuraw <i>Grus grus</i>	M	2000	min. 40 i		
Żuraw <i>Grus grus</i>	L	2007	9–10 p		
<b>Siewka złota <i>Pluvialis apricaria</i></b>	M	2008–2009	4000–11000 i		<b>B1i, C2</b>
Czajka <i>Vanellus vanellus</i>	M	2008	3000–5000 i		
Batalion <i>Philomachus pugnax</i>	M	2008	min. 100 i		
<b>Rycyk <i>Limosa limosa</i></b>	M	2008	min. 90 i		<b>A1, C1</b>
Rycyk <i>Limosa limosa</i>	L	2000	min. 7 p		
Krwawodziób <i>Tringa totanus</i>	L	2001	min. 2 p		
Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	L	1999	1–6 p		
<b>Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i></b>	L	1999	20–60 p		<b>C6</b>
Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	M	2007	min. 40 i		
Dzięcioł zielonosiwý <i>Picus canus</i>	L?	1999	min. 1 p		
Dzięcioł czamy <i>Dryocopus martius</i>	L	2007	3–5 p		
Dzięcioł średni <i>Dendrocopos medius</i>	L	2007	min. 6 p		
Lerka <i>Lullula arborea</i>	L	2000	min. 10 p		
Świergotek polny <i>Anthus campestris</i>	L	2000	5–10 p		
Podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>	L	1999	min. 1 p		
Jarzębka <i>Sylvia nisoria</i>	L	1999	min. 7 p		
Mucholówka mała <i>Ficedula parva</i>	L	1996	min. 1 p		
Gąsiorek <i>Lanius collurio</i>	L	2007	28–36 p		



najcenniejszym rezerwuarem wody w ostoi. Wyróbiska po dawnej eksploatacji torfu stanowią istotny element w krajobrazie omawianego obszaru. Koryta rzek są wyprostowane, a dolinę w wielu miejscach odwadnia sieć rowów melioracyjnych. Łąki te okresowo są zalewane (wiosną) i stanowią miejsce masowego odpoczynku ptaków w okresie wędrówek wiosennych. Gdzieś tam teren zarasta trzciną i ziołoroślami, jednak znaczna ich część jest systematycznie wykaszana. Łąki przylegają bezpośrednio do pól uprawnych (uprawa kukurydzy i zbóż), na których chętnie żerują gęsi. W kilku miejscach obszar przecinają niewielkie lasy mieszane, znacznie urozmaicające tutejszą faunę i florę. Ważnym punktem ostoi jest Jezioro Szczawińskie – łęgowisko rybitwy czarnej (do 60 par), kropiatki (do 15 par), zielonki (6–8 par) oraz bączka, którego liczebność sięga w niektóre lata 15 par.

### Siedliska i typy użytkowania gruntów w ostoi

Lasy i zadrzewienia – 5%, łąki i pastwiska – 55%, inne tereny rolne – 25%, mokradła – 5%, zbiorniki wodne i cieki – 5%, inne – 5%.

### Formy ochrony przyrody:

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy.

### Ptaki

Ostoję wyróżnia się jako miejsce koncentracji gatunków wodno-błotnych, do 50 000 osobników w okresie wiosennym. Populacja gęsi (białoczelnej, zbożowej i gegawy) osiąga wiosną liczebność ponad 20 000 os., a siewki złotej do 11 000 os. Gatunkami łęgowymi kwalifikującymi ostoję są: bączek i rybitwa czarna. W ostoi gniazdowało od 24 do 30 gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz od 6 do 8 gatunków figurujących w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.

### **Inne walory przyrodnicze ostoi**

W ostoi licznie występują bobry i wydry, a także kumaki nizinne i grzebiuszki – gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Stwierdzono też łąki storczykowe. Jak dotąd na tym terenie nie przeprowadzono kompleksowej inwentaryzacji faunistycznej (oprócz ptaków) ani florystycznej.

### **Zagrożenia**

#### **Kluczowe zagrożenia w ostoi**

- przekształcanie trwałych użytków zielonych w pola orne;
- pogłębianie koryt rzek, czyszczenie rowów melioracyjnych, wypalanie trzcinowisk, zabudowa;
- od kilku lat próby gniazdowania podejmują bieliki – skutecznie płoszone przez myśliwych z miejscowego koła łowieckiego.

### **Inne ważne zagrożenia w ostoi**

- brak działań mających na celu utrzymanie podmokłego charakteru łąk.

### **Podziękowania**

Autorzy dziękują osobom, których dane zostały wykorzystane w niniejszej charakterystyce ostoi, są to: Mirosław Nowicki, Tomasz Bartos, Bogdan Kaźmierczak, Łukasz Kałębasiak, Tadeusz Musiał, Marcin Faber, Paweł Kozanecki, Tomasz Przybyliński, Krzysztof Myśliwiec.

### **Źródła danych**

Chmielewski, Klimczak, Nowicki, Bartos, Kaźmierczak, Kałębasiak, Musiał, Faber, Kozanecki, Przybyliński, Myśliwiec – dane niepubl. z lat 2004–2009, Kartoteka Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Kaźmierczak (msc), Malinowska i in. (1990).